



RANULA

La ranula è una cisti benigna da ritenzione che colpisce la ghiandola sottolinguale, dovuta al ristagno di saliva.

Si presenta come una tumefazione vagamente rotondeggiante, dalla superficie liscia, di consistenza molle, duro-elastica, di aspetto traslucido, che solleva la mucosa del pavimento della bocca.



Il nome deriva dalla sua somiglianza con i sacchi membranosi che le rane presentano tipicamente ai lati della mascella inferiore.



Si localizza in genere a lato del frenulo linguale, il quale può risultare talmente teso sulla linea mediana da conferire alla ranula, in alcuni casi, un aspetto bilobato.



Quando è molto voluminosa può determinare gravi problemi alla masticazione, alla deglutizione e alla fonazione.

Le cause determinanti la formazione della ranula sono generalmente l'infiammazione recidivante (sialoadenite) e la calcolosi della ghiandola stessa (sialolitiasi).

E' caratterizzata solitamente da un accrescimento molto lento, a volte di anni, e il paziente ne prende coscienza in genere all'appalesarsi dei disturbi prima descritti, che compaiono spesso tardivamente.

L'aspirazione del contenuto cistico evidenzierà la presenza di essudato sieroso-mucoso all'interno della formazione.



L'ecografia è l'esame elettivo per confermare la diagnosi.

In caso di dubbio diagnostico, al fine di escludere altre più importanti patologie come Tumori, Adenomi, Linfomi, ecc... possono essere richieste TAC e RMN corredati, in alcuni casi, dall'Esame Citologico eseguito su Ago Aspirato.



Ecografia



TAC

La **terapia** è chirurgica e prevede l'asportazione della cisti mucosa attraverso una tecnica detta di "marsupializzazione" che non prevede tagli esterni e si esegue per via endo-orale.

